

KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT
NATIONAL ANIMAL BREEDING CENTRE



HODOWLA
ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
W 2017 ROKU

WARSZAWA 2018

SPIS TREŚCI

I.	OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ	5
II.1.	WYNIKI OCENY FENOTYPU	8
II.2.	WYNIKI OCENY UŻYTKOWOŚCI ROZPŁODOWEJ	10
III.	KSIEGI HODOWLANE	15
IV.	WYSTAWY I POKAZY	16

I. OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ

W 2017 r. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt prowadziło ocenę wartości użytkowej i hodowlanej w 310 stadach zwierząt futerkowych o łącznej liczebności 39 267 szt. samic stada podstawowego. W stosunku do 2016 roku liczba samic stada podstawowego w stadach objętych oceną wartości użytkowej była niższa o 5 493 szt., a liczba stad była wyższa o 1. Spadek liczebności samic stada podstawowego odnotowano w stadach nerek amerykańskich (o 6 118 szt.), lisów pospolitych (o 292 szt.), nutrii (o 94 szt.), lisów polarnych (o 25 szt.), tchórzów (o 2 szt.). Liczba samic wzrosła w stadach szynszyli (o 1 029 szt.), jenotów (o 8 szt.) i królików (o 1 szt.). Liczbę stad i liczebność samic stada podstawowego poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej w latach 2016-2017 przedstawiono w tabeli 1 i 2, procentowy udział samic stada podstawowego poszczególnych gatunków w 2017 r. przedstawiono na wykresie 1.


Tabela 1. Liczba stad i liczebność samic stada podstawowego poszczególnych gatunków mięsożernych zwierząt futerkowych objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej w latach 2016 – 2017.

Gatunek, odmiana	Liczba stad /szt./		Liczba samic stada podstawowego /szt./	
	2016	2017	2016	2017
Lisy pospolite ogółem	15	14	1 893	1 601
w tym:				1 429
- lisy pospolite srebrzyste	12	11	1 723	70
- lisy pospolite pastelowe	1	1	67	102
- lisy pospolite białoszynne	2	2	103	
Lisy polarne	6	5	1 170	1 145
Norki amerykańskie ogółem	48	42	32 240	26 122
w tym odmiany:				
- standard	6	6	2 258	2 270
- pastel	20	16	17 985	12 370
- biała Hedlunda	3	3	1 172	962
- palomino	3	3	1 730	1 828
- krzyżak	6	6	2 725	3 075
- szafir	4	2	2 400	1 700
- perła	5	5	3 858	3 762
- silverblue	1	1	112	155
Tchórze	2	2	67	65
Jenoty	1	1	40	48

Tabela 2. Liczba stad i liczebność samic stada podstawowego poszczególnych gatunków roślinożernych zwierząt futerkowych objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej w latach 2016 – 2017.

Gatunek, odmiana, rasa/odmiana	Liczba stad /szt./		Liczba samic stada podstawowego /szt./	
	2016	2017	2016	2017
Nutrie ogółem	14	14	425	331
w tym odmiany:				
- standardowe	3	3	135	92
- grenlandzkie	2	2	108	82
- perłowe	1	1	10	10
- czarne dominujące	2	2	55	40
- bursztynowozłociste	2	2	47	38
- pastelowe	2	2	25	22
- białe niealbinotyczne	1	1	27	28
- sobolowe	1	1	18	19
Królik ogółem	165	172	2 196	2 197
w tym rasy:				
- belgijski olbrzym biały	6	5	50	40
- belgijski olbrzym	31	33	354	377
- olbrzym srokacz	13	14	134	135
- francuski baran	10	10	97	101
- morawski olbrzym	1	1	10	10
- francuski srebrzysty	1	1	8	9
- wielki jasnosrebrzysty	4	3	40	35
- szynszyl wielki	3	3	28	28
- wiedeński niebieski	12	12	104	103
- wiedeński czarny	2	2	17	17
- wiedeński szary	4	3	37	24
- wiedeński biały	2	2	16	16
- nowozelandzki czerwony	11	11	113	105
- nowozelandzki biały	21	23	301	298
- burgundzki	4	4	33	33
- kalifornijski	19	19	197	182
- popielniarski biały	8	8	371	356
- termondzki biały	4	7	207	237
- castorex	2	2	23	16
- podpalany czarny	1	1	8	8
- hermelin	3	3	24	24
- hawana	1	1	8	8
- holenderski	1	1	8	8
- zajęczak	1	1	8	8
- rex biały czerwonooki	-	1	-	8
- rex ryś	-	1	-	11
Szynszyle ogółem	58	60	6 729	7 758
w tym odmiany:				
- standard i czarne aksamitne	44	45	6 381	7 378
- beżowe	14	15	348	380

Wykres 1. Udział samicy stada podstawowego poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej w 2017 r.



Największa liczba stad zwierząt futerkowych mięsożernych objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej była zlokalizowana na północy i zachodzie kraju, głównie w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i lubuskim – łącznie 27 375 szt. (94,5%). Oceniane stada zwierząt futerkowych roślinożernych rozmieszczone były na terenie całej Polski ale dominowały w części południowo-wschodniej, południowej, centralnej i wschodniej – łącznie 6 136 szt. (59,6%).

II. 1. WYNIKI OCENY FENOTYPU

Ocena fenotypu zwierząt futerkowych mięsożernych obejmuje ocenę organoleptyczną wyglądu ogólnego zwierzęcia, uwzględniającą budowę zwierzęcia i jego okrywą włosową, w celu ustalenia stopnia zgodności z wzorcem odmiany, wyrażonego literami i znakami: A, B+, B lub C. Wyniki uzyskane w 2017 r. przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Wyniki oceny fenotypu mięsożernych zwierząt futerkowych w 2017 r.

Gatunek, odmiana	Liczba zwierząt /szt./		Procent zwierząt					
	odsadzonych	ocenionych	ocenionych	zaliczonych do kategorii				przeznaczonych do hodowli
				A	B+	B	C	
Lisy pospolite ogółem	4 913	1 202	24,5	20,1	28,9	29,0	22,0	78,0
w tym:								
- lisy pospolite srebrzyste	4 288	1 141	26,6	20,3	28,0	28,7	23,0	77,0
- lisy pospolite pastelowe	294	39	13,3	10,3	41,0	41,0	7,7	92,3
- lisy pospolite białoszyjne	331	22	6,6	22,7	54,6	22,7	0,0	100
Lisy polarne	4 263	1 299	30,5	43,0	44,0	10,2	2,8	97,2
Norki amerykańskie ogółem	112 277	46 646	41,5	31,9	19,7	26,0	22,4	77,6
w tym:								
- norki odmiany standard	8 777	2 049	23,3	62,0	25,6	8,9	3,5	96,5
- norki odmian barwnych ogółem:	103 500	44 597	43,1	30,5	19,4	26,8	23,3	76,7
w tym odmiany:								
- pastel	53 693	25 740	47,9	26,6	22,2	27,2	24,0	76,0
- biała Hedlunda	3 891	1 966	50,5	65,3	7,2	16,8	10,7	89,3
- palomino	8 261	2 850	34,5	38,4	10,7	18,7	32,2	67,8
- krzyżak	13 898	3 599	25,9	49,4	20,5	20,3	9,8	90,2
- szafir	5 494	1 400	25,5	79,9	14,4	2,0	3,7	96,3
- perła	17 639	8 930	50,6	16,5	16,9	37,0	29,6	70,4
- silverblue	624	112	17,9	10,7	33,9	30,4	25,0	75,0
Tchórze	199	31	15,6	19,4	64,5	12,9	3,29	96,8
Jenoty	165	30	18,2	3,3	36,7	53,3	6,7	93,3

Ocena fenotypu zwierząt futerkowych roślinożernych, w zależności od gatunku, obejmuje wielkość zwierzęcia, budowę, typ barwny, barwę, czystość barwy i jakość okrywy włosowej, typ rasowy, specyficzne cechy rasowe oraz pas brzuszny oceniane organoleptycznie w celu ustalenia stopnia zgodności z wzorcem danej odmiany lub rasy i odmiany, wyrażonego w punktach. Wyniki uzyskane w 2017 r. przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Wyniki oceny fenotypu roślinożernych zwierząt futerkowych w 2017 r.

Gatunek, odmiana	Poddano ocenie fenotypu /szt./	Procent zwierząt						
		z punktacją /pkt/						zdyskwalifikowane do celów hodowlanych
		20-19	18-17	16-15	≤14	0	X	
Nutrie ogółem	116	61,2	38,8	0,0	0,0	0,0		0,0
w tym:								
- nutrie standardowe	28	78,6	21,4	0,0	0,0	0,0		0,0
- nutrie grenlandzkie	34	61,8	38,2	0,0	0,0	0,0		0,0
- nutrie perłowe	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- nutrie czarne dominujące	16	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- nutrie bursztynowozłociste	10	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- nutrie pastelowe	3	0,0	100	0,0	0,0	0,0		0,0
- nutrie sobolowe	11	54,5	45,5	0,0	0,0	0,0		0,0
- nutrie białe niealbinotyczne	14	64,3	35,7	0,0	0,0	0,0		0,0
		30-29	28-27	26-25	≤ 24	0	X	
Szynszyle ogółem	8 112	0,9	13,9	32,4	51,9	0,9		0,9
w tym:								
- szynszyle standard i czarne aksamitne	7 840	0,8	13,4	32,1	52,7	1,0		1,0
- szynszyle beżowe	272	3,3	29,0	40,5	27,2	0,0		0,0
		100-96	95,5-94	93,5-92	91,5-89	≤ 88,5	0	
Króliki	1 615	20,3	63,1	12,9	3,4	0,1	0,2	0,2

II. 2. WYNIKI OCENY UŻYTKOWOŚCI ROZPŁODOWEJ

Wyniki oceny użytkowości rozplodowej mięsożernych zwierząt futerkowych w stadach objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej w 2017 roku w porównaniu do roku 2016 zawarto w tabeli 5, wyniki oceny użytkowości rozplodowej roślinożernych zwierząt futerkowych - w tabeli 6.

Tabela 5. Wyniki oceny użytkowości rozplodowej zwierząt futerkowych mięsożernych w stadach objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej w latach 2016–2017.

Gatunek, odmiana Rok	Liczba samic do krycia [%]	Procent samic						Średnia liczba młodych od 1 samicy		Procent odchowu młodych /odchowane do urodzonych/
		niepokrytych	jałowych	roniących	padłych	wykończonych	niszczących mioty	urodzonych*/	odchowanych*/	

Lisy pospolite ogółem

2016	100,0	4,6	6,3	0,9	0,1	88,1	8,8	3,6	3,2	87,7
2017	100,0	4,0	6,2	1,1	0,4	88,3	10,1	3,7	3,1	82,9

w tym:

lisy pospolite srebrzyste

2016	100,0	4,7	6,0	0,9	0,1	88,3	9,0	3,5	3,1	88,0
2017	100,0	3,9	5,7	1,1	0,3	89,0	10,1	3,6	3,0	83,8

lisy pospolite pastelowe

2016	100,0	6,0	7,4	3,0	0,0	83,6	9,0	4,7	4,4	93,6
2017	100,0	5,7	11,4	2,9	0,0	80,0	5,7	4,3	3,6	84,1

lisy pospolite białoszyjne

2016	100,0	2,9	10,7	0,0	0,0	86,4	5,8	4,7	3,7	79,5
2017	100,0	4,9	10,8	0,0	1,0	83,3	12,7	4,5	3,3	71,8

Lisy polarne

2016	100,0	8,2	4,9	1,8	0,1	85,0	3,6	4,5	4,2	93,7
2017	100,0	6,0	5,9	1,5	0,3	86,3	3,7	4,2	3,7	89,5

Jenoty

2016	100,0	0,0	7,5	0,0	0,0	92,5	15,0	7,4	4,0	54,1
2017	100,0	0,0	8,3	2,1	4,2	85,4	12,5	4,9	3,4	69,9

Tchórze

2016	100,0	34,3	10,5	0,0	3,0	52,2	0,0	4,7	3,6	76,4
2017	100,0	49,2	10,8	0	0	40,0	1,5	4,1	3,1	75,1

*/ średnie obliczone w stosunku do liczby samic do krycia

Tabela 5. cd.

Gatunek, odmiana Rok	Liczba samic do krycia [%]	Procent samic						Średnia liczba młodych od 1 samicy		Procent odchowu młodych /odchowane do urodzonych/
		niepokrytych	jałowych	roniących	padłych	wykończonych	niszczących mioty	urodzonych*/	odchowanych*/	

Norki amerykańskie ogółem

2016	100,0	2,6	5,3	0,7	2,1	89,3	2,9	5,2	4,7	89,8
2017	100,0	3,2	5,6	0,8	3,1	87,3	3,1	4,9	4,3	88,5

w tym odmiany:

norki standard

2016	100,0	1,1	5,9	0,9	2,1	90,0	2,5	4,7	4,2	88,7
2017	100,0	2,1	5,8	1,6	2,6	87,9	3,5	4,4	3,9	88,0

norki pastel

2016	100,0	2,9	4,8	0,5	1,3	90,5	3,2	5,5	4,9	89,3
2017	100,0	3,8	4,9	0,4	2,3	88,6	3,3	4,9	4,3	88,0

norki krzyżak

2016	100,0	1,3	3,7	1,3	2,6	91,1	2,8	5,1	4,7	92,9
2017	100,0	1,6	4,6	0,5	5,2	88,1	3,7	5,0	4,5	89,7

norki biała Hedlunda

2016	100,0	4,4	6,8	1,7	1,5	85,6	2,7	4,2	3,7	88,8
2017	100,0	3,6	5,7	2,4	1,7	86,6	1,6	4,4	4,1	92,4

norki szafir

2016	100,0	2,1	12,9	1,1	10,5	73,4	3,8	4,6	3,9	85,8
2017	100,0	3,4	19,2	2,4	12,1	62,9	4,6	3,6	3,2	90,2

norki palomino

2016	100,0	1,2	3,9	0,5	1,4	93,0	1,9	5,6	5,0	89,5
2017	100,0	1,7	4,2	0,5	2,6	91,0	1,0	5,1	4,5	89,4

norki perła

2016	100,0	3,1	4,2	0,5	1,0	91,2	2,2	5,1	4,8	93,3
2017	100,0	3,8	3,1	0,3	1,2	91,6	2,2	5,3	4,7	88,2

norki silverblue

2016	100,0	0,0	8,0	0,0	0,0	92,0	8,0	5,3	4,7	87,6
2017	100,0	2,6	9,0	0,0	0,7	87,7	11,0	5,2	4,0	77,0

*/ średnie obliczone w stosunku do liczby samic do krycia

Tabela 6. Wyniki oceny użytkowości rozplodowej zwierząt futerkowych roślinożernych w stadach objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej w latach 2016–2017.

Rok	Średnia liczba miotów uzyskana od 1 samicy w roku*/	Średnia liczba młodych uzyskana od 1 samicy w roku*/		Średnia liczba młodych uzyskana z 1 miotu w roku*/		Procent odchovu /odchowane do urodzonych/
		urodzonych	odchowanych	urodzonych	odchowanych	

Nutrie ogółem

2016	1,1	4,9	4,5	4,7	4,4	92,2
2017	0,9	4,7	4,2	4,2	5,5	87,7

w tym odmiany:

nutrie standardowe

2016	0,9	4,5	4,2	5,1	4,6	91,9
2017	0,9	5,2	4,6	5,8	5,0	87,6

nutrie czarne dominujące

2016	1,2	5,1	4,7	4,4	4,0	91,5
2017	0,8	4,1	3,6	5,2	4,6	90,4

nutrie bursztynowozłociste

2016	1,2	5,4	4,9	4,6	4,2	90,5
2017	0,9	5,7	5,2	6,0	5,6	92,7

nutrie grenlandzkie

2016	1,1	5,4	5,1	4,8	4,5	94,3
2017	0,9	4,6	4,0	5,3	4,5	85,8

nutrie perłowe

2016	1,0	3,6	3,1	3,6	3,1	86,1
2017	1,0	5,1	4,3	5,1	4,3	83,3

nutrie pastelowe

2016	1,1	4,8	4,5	4,5	4,3	94,4
2017	0,9	5,9	5,3	6,4	5,6	88,8

nutrie białe niealbinotyczne

2016	1,0	4,5	4,0	4,5	4,0	89,7
2017	0,7	3,4	3,0	4,9	4,3	88,2

nutrie sobolowe

2016	1,0	5,0	4,5	5,0	4,5	90,0
2017	0,6	2,4	2,1	4,3	3,8	88,2

Szynszyle ogółem

2016	1,6	3,3	3,0	2,1	1,9	89,7
2017	1,5	3,1	2,8	2,2	1,9	89,2

w tym odmiany:

szynszyle standard i czarne aksamitne

2016	1,6	3,3	3,0	2,1	1,9	89,7
2017	1,5	3,1	2,8	2,2	1,9	89,1

szynszyle beżowe

2016	1,4	2,9	2,7	2,0	1,9	91,5
2017	1,4	3,0	2,7	2,1	1,9	92,0

*/ średnie obliczone w stosunku do średniego stanu samic użytkowanych rozplodowo

Tabela 6. cd.

Rok	Średnia liczba miotów uzyskana od 1 samicy w roku*/	Średnia liczba młodych uzyskana od 1 samicy w roku*/		Średnia liczba młodych uzyskana z 1 miotu w roku*/		Procent odchovu /odchowane do urodzonych/
		urodzonych	odchowanych	urodzonych	odchowanych	
Króliki ogółem						
2016	1,8	11,0	9,2	6,2	5,2	83,4
2017	1,7	10,8	9,1	6,2	5,2	83,8
w tym rasy:						
królik belgijski olbrzym biały						
2016	1,4	8,7	7,2	6,4	5,3	82,3
2017	1,2	7,6	6,5	6,3	5,4	85,8
królik belgijski olbrzym						
2016	1,3	8,1	6,4	6,1	4,8	79,0
2017	1,3	7,7	5,8	6,2	4,7	75,4
królik olbrzym srokacz						
2016	1,5	10,0	7,1	6,9	4,9	70,6
2017	1,3	8,6	6,1	6,9	4,8	70,0
królik francuski baran						
2016	1,3	7,6	5,4	5,8	4,1	70,7
2017	1,3	7,5	6,4	6,4	4,8	75,3
królik morawski olbrzym						
2016	1,1	7,4	5,8	6,6	5,1	78,0
2017	0,9	6,6	5,2	7,3	5,8	78,8
królik francuski srebrzysty						
2016	0,9	6,1	5,3	7,0	6,0	85,7
2017	1,2	8,8	6,7	7,2	5,5	76,0
królik wielki jasnosrebrzysty						
2016	1,0	5,9	4,9	5,9	4,9	82,5
2017	1,0	7,1	6,5	5,2	4,8	92,3
królik szynszyl wielki						
2016	1,4	9,3	7,5	6,6	5,3	80,2
2017	1,4	9,1	7,4	6,7	5,5	81,3
królik wiedeński niebieski						
2016	1,1	6,1	5,5	5,6	5,0	89,2
2017	1,2	6,6	5,6	5,6	4,8	85,1
królik wiedeński czarny						
2016	1,9	10,6	10,1	6,8	6,5	95,7
2017	1,2	8,4	8,0	6,8	6,5	95,3
królik wiedeński biały						
2016	1,6	8,8	8,1	5,4	5,0	92,2
2017	1,1	7,8	5,2	6,8	4,6	67,0
królik wiedeński szary						
2016	1,5	8,9	7,3	6,1	5,1	82,7
2017	1,5	8,2	7,1	5,4	4,7	86,6
królik nowozelandzki czerwony						
2016	1,3	7,1	6,0	5,4	4,5	84,6
2017	1,2	6,2	5,3	5,3	4,5	84,7

*/ średnie obliczone w stosunku do średniego stanu samic użytkowanych rozładowo

Tabela 6. cd.

Rok	Średnia liczba miotów uzyskana od 1 samicy w roku*/	Średnia liczba młodych uzyskana od 1 samicy w roku*/		Średnia liczba młodych uzyskana z 1 miotu w roku*/		Procent odchowu /odchowane do urodzonych/
		urodzonych	odchowanych	urodzonych	odchowanych	
królik nowozelandzki biały						
2016	1,6	8,1	6,8	5,2	4,4	84,9
2017	1,5	7,0	6,2	4,8	4,3	88,6
królik burgundzki						
2016	1,4	10,0	8,0	7,3	5,8	79,7
2017	1,3	8,5	7,3	6,6	5,7	85,9
królik kalifornijski						
2016	1,7	10,4	9,3	6,2	5,5	89,2
2017	1,5	9,4	8,2	6,2	5,5	88,1
królik popielniński biały						
2016	2,4	15,2	12,7	6,3	5,3	84,0
2017	2,6	16,5	14,1	6,3	5,4	85,7
królik termondzki biały						
2016	2,9	21,2	18,2	7,2	6,2	85,9
2017	3,0	21,5	18,7	7,2	6,3	87,1
królik castorex						
2016	1,2	5,9	5,3	5,1	4,6	90,1
2017	1,4	7,7	5,4	5,5	3,9	70,1
królik podpalany czarny						
2016	1,8	7,3	5,6	4,1	3,1	77,2
2017	2,5	9,9	8,9	4,0	3,6	89,9
królik hermelin						
2016	1,5	5,0	3,4	3,3	2,3	68,8
2017	1,7	5,8	3,8	3,4	2,2	66,1
królik hawana						
2016	2,0	12,0	9,3	6,0	4,6	77,1
2017	1,4	8,9	7,7	6,2	5,4	87,1
królik holenderski						
2016	1,8	6,8	6,0	3,8	3,3	88,2
2017	0,8	4,9	4,4	6,5	5,8	89,7
królik zajęczak						
2016	1,0	7,0	5,5	7,0	5,5	78,6
2017	0,8	6,4	2,8	8,5	3,7	43,1
królik rex biały czerwonoooki						
2016	-	-	-	-	-	-
2017	1,6	5,4	5,4	3,4	3,4	100
królik rex ryś						
2016	-	-	-	-	-	-
2017	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0	100

*/ średnie obliczone w stosunku do średniego stanu samic użytkowanych rozplodowo

III. KSIĘGI HODOWLANE

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt prowadzi księgi hodowlane dla każdego z gatunków zwierząt futerkowych: lisów pospolitych, lisów polarnych, norek amerykańskich, tchórz, jenotów, nutrii, szynszyli i królików. W 2017 roku do ksiąg hodowlanych dla zwierząt futerkowych wpisano 14 stad – wszystkie do części wstępnej księgi, w tym: 8 stad królików, 5 stad szynszyli i 1 stado norek. Liczbę stad wpisanych do części wstępnej i głównej ksiąg dla zwierząt futerkowych oraz liczbę samic i samców w stadach wpisanych na dzień 31.12.2017 r. przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Liczba stad poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych wpisanych do ksiąg oraz liczba samic i samców w stadach wpisanych do ksiąg na dzień 31.12.2017 r.

Gatunek	Liczba stad wpisanych do części księgi		Liczba zwierząt w stadach wpisanych do części wstępnej		Liczba zwierząt w stadach wpisanych do części głównej	
	wstępna	główna	samce	samice	samce	samice
Lisy pospolite	1	13	26	70	368	1 531
Lisy polarne	-	5	-	-	258	1 145
Norki amerykańskie	16	25	2 406	10 278	3 802	15 744
Tchórze	-	2	-	-	17	65
Jenoty	-	1	-	-	12	48
Nutrie	4	10	18	85	48	246
Szynszyle	25	26	673	2 998	805	3 356
Króliki	49	79	104	476	360	1 297
Ogółem w kraju	95	161	3 227	13 907	5 670	23 432

IV. WYSTAWY I POKAZY

1. XVIII KRAJOWY POKAZ SUROWYCH SKÓR ZWIERZĄT FUTERKOWYCH W BYDGOSZCZY

W dniu 04.02.2017 r. odbył się XIX Krajowy Pokaz Surowych Skór Futerkowych w Bydgoszczy, którego organizatorami byli Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, „Skinpolex” Sp. z o.o. oraz Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Zaprezentowano łącznie 2 309 szt. skór. Liczbę skór zgłoszonych w danym gatunku i odmianie barwnej (zgodnie z protokołem oceny), a także liczbę lotów oraz hodowców prezentujących skóry zawarto w zestawieniu:

Liczba skór zgłoszonych w danym gatunku i odmianie barwnej	Liczba lotów	Liczba hodowców zgłaszających skóry
54 szt. skór lisów pospolitych srebrzystych	18	5
205 szt. skór norek amerykańskich - cross (black, silverblue) - samce	41	19
135 szt. skór norek amerykańskich - cross (black, silverblue) - samice	27	16
115 szt. skór norek amerykańskich - cross (palomino, perła) - samce	23	8
55 szt. skór norek amerykańskich - cross (palomino, perła) - samice	11	8
130 szt. skór norek amerykańskich - silverblue (samce)	26	18
60 szt. skór norek amerykańskich - silverblue (samice)	12	12
210 szt. skór norek amerykańskich - białe (samce)	42	14
195 szt. skór norek amerykańskich - białe (samice)	39	14
165 szt. skór norek amerykańskich - perła (samce)	33	14
75 szt. skór norek amerykańskich - perła (samice)	15	10
155 szt. skór norek amerykańskich - palomino (samce)	31	15
80 szt. skór norek amerykańskich - palomino (samice)	16	13
25 szt. skór norek amerykańskich – pastel (samce)	5	5
15 szt. skór norek amerykańskich – szafir (samice)	3	3
35 szt. skór norek amerykańskich - mahogan (samce)	7	7
45 szt. skór norek amerykańskich – czarne + mahogan (samice)	9	7
165 szt. skór norek amerykańskich kolor - scanbrown (samce)	33	17
200 szt. skór norek amerykańskich - scanbrown (samice)	40	19
90 szt. skór norek amerykańskich - scanglow (samce)	18	12
75 szt. skór norek amerykańskich - scanglow (samice)	15	9
25 szt. skór norek amerykańskich czarnych (samce)	5	5

2. WYSTAWY REGIONALNE I BRANŻOWE

W 2017 r. odbyło się kilkadziesiąt regionalnych i branżowych wystaw zwierząt futerkowych, podczas których w ocenie zwierząt uczestniczyli pracownicy Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół KCHZ:

- IX Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych w Lublinie organizowana przez Lubelski Związek Hodowców Królików Rasowych.
- XIV Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Gołębi w Wieluniu organizowana przez Burmistrza Miasta Wielunia, Starostę Powiatu Wieluńskiego, Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego i Związek Hodowców Królików i Drobego Inwentarza Ziemi Wieluńskiej.
- Wiosenna XXXVIII Wystawa Szynszyli w Myślenicach organizowana przez Krajowy Związek Hodowców Szynszyli.
- Regionalna Wystawa Królików Rasowych w Minikowie organizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
- XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sielinku organizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
- X Kujawsko-Pomorskie Seminarium i Wystawa Szynszyli w Minikowie organizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Krajowy Związek Hodowców Szynszyli.
- XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie organizowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego.
- XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Piotrowicach organizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
- XIX Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale organizowana przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
- I Międzynarodowa Wystawa Królików w Bielsku Podlaskim organizowana przez Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego.
- XXVII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agropromocja 2017 w Nawojowej organizowana przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Krajowy Związek Hodowców Szynszyli.
- Wystawa Królików podczas XXX edycji Barzkowickich Targów Rolnych AGRO Pomerania w Barzkowicach organizowana przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
- XV Wojewódzka Wystawa Królików w Lubaniu organizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
- V Krajowa Wystawa Królików Rasowych w Konstantynowie Łódzkim organizowana przez Łódzki Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych i Drobego Inwentarza.

- Pokaz Drobnego Inwentarza w Przysieku organizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
- VI Mazowieckie Seminarium i Wystawa Szynszyli w Warszawie organizowana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Krajowy Związek Hodowców Szynszyli.
- Krajowa Wystawa Młodych Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików w Czaplinku organizowana przez Środkowopomorski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.
- XXXIX Seminarium i Wystawa Szynszyli KZHS w Krakowie organizowana przez Krajowy Związek Hodowców Szynszyli.
- Regionalna Wystawa Młodych Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików w Poznaniu organizowana przez Wielkopolski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobnego Inwentarza.
- Bałtycka Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików w Gdańsku organizowana przez Trójmiejski Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt.