

**KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT
NATIONAL ANIMAL BREEDING CENTRE**



**HODOWLA
ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
W 2019 ROKU**

WARSZAWA 2020

SPIS TREŚCI

I.	OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ	5
II.1.	WYNIKI OCENY FENOTYPU	8
II.2.	WYNIKI OCENY UŻYTKOWOŚCI ROZPŁODOWEJ	10
III.	KSIEGI HODOWLANE	15
IV.	WYSTAWY I POKAZY	15

I. OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ

W 2019 r. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt prowadziło ocenę wartości użytkowej i hodowlanej w 258 stadach zwierząt futerkowych o łącznej liczebności 28 309 szt. samic stada podstawowego. W stosunku do 2018 roku liczba samic stada podstawowego w stadach objętych oceną wartości użytkowej była niższa o 3 336 szt., a liczba stad była niższa o 30. Spadek liczebności samic stada podstawowego odnotowano w stadach szynszyli (o 1 530 szt.), norek amerykańskich (o 1 224 szt.), lisów pospolitych (o 384 szt.), królików (o 92 szt.), nutrii (43 szt.) tchórzy (o 41 szt.), lisów polarnych (o 25 szt.). Zwiększyła się liczba samic w jedynym stadzie jenotów (o 3 szt.). Liczbę stad i liczebność samic stada podstawowego poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej w latach 2018-2019 przedstawiono w tabeli 1 i 2, procentowy udział samic stada podstawowego poszczególnych gatunków w 2019 r. przedstawiono na wykresie 1.


Tabela 1. Liczba stad i liczebność samic stada podstawowego poszczególnych gatunków mięsożernych zwierząt futerkowych objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej w latach 2018 – 2019.

Gatunek, odmiana	Liczba stad /szt./		Liczba samic stada podstawowego /szt./	
	2018	2019	2018	2019
Lisy pospolite ogółem	12	10	1 374	990
w tym:				
- lisy pospolite srebrzyste	9	7	1 196	832
- lisy pospolite pastelowe	1	1	74	72
- lisy pospolite białoszyczne	2	2	104	86
Lisy polarne	4	3	1 035	1 010
Norki amerykańskie ogółem	30	26	19 200	17 976
w tym odmiany:				
- standard	4	3	1 434	1 320
- pastel	12	10	9 860	9 100
- biała Hedlunda	2	2	266	278
- palomino	2	2	1 132	1 142
- krzyżak	5	4	2 378	2 026
- szafir	1	1	1 000	1 000
- perła	3	3	2 980	2 960
- silverblue	1	1	150	150
Tchórze	2	1	69	28
Jenoty	1	1	47	50

Tabela 2. Liczba stad i liczebność samic stada podstawowego poszczególnych gatunków roślinożernych zwierząt futerkowych objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej w latach 2018 – 2019.

Gatunek, odmiana, rasa/odmiana	Liczba stad /szt./		Liczba samic stada podstawowego /szt./	
	2018	2019	2018	2019
Nutrie ogółem	14	14	250	207
w tym odmiany:				
- standardowe	3	3	70	55
- grenlandzkie	2	2	55	46
- perłowe	1	1	10	10
- czarne dominujące	2	2	35	26
- bursztynowozłociste	2	2	30	24
- pastelowe	2	2	20	20
- białe niealbinotyczne	1	1	15	14
- sobolowe	1	1	15	12
Królik ogółem	170	159	2 197	2 105
w tym rasy:				
- belgijski olbrzym biały	6	6	48	50
- belgijski olbrzym	38	35	423	388
- olbrzym srokacz	12	11	112	101
- francuski baran	8	8	88	93
- morawski olbrzym	1	1	10	10
- francuski srebrzysty	1	1	8	8
- wielki jasnosrebrzysty	2	2	28	27
- szynszyl wielki	1	1	8	8
- wiedeński niebieski	10	9	87	82
- wiedeński czarny	3	2	25	18
- wiedeński szary	3	4	28	43
- wiedeński biały	1	1	8	8
- nowozelandzki czerwony	10	10	94	101
- nowozelandzki biały	21	19	260	227
- burgundzki	4	4	32	32
- kalifornijski	19	16	189	161
- popielniański biały	10	10	403	448
- termondzki biały	10	8	265	204
- castorex	1	1	8	8
- podpalany	1	2	8	20
- hermelin	3	3	25	28
- hawana	1	1	8	8
- holenderski	1	1	8	8
- zajęczak	1	1	8	8
- rex biały czerwonoooki	1	1	8	8
- rex ryś	1	1	8	8
Szynszyle ogółem	55	44	7 473	5 943
w tym odmiany:				
- standard i czarne aksamitne	42	31	7 121	5 556
- beżowe	13	13	352	387

Wykres 1. Udział samicy stada podstawowego poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej w 2019 r.



Największa liczba stad zwierząt futerkowych mięsożernych objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej była zlokalizowana na północy i zachodzie kraju, głównie w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i lubuskim – łącznie 18 905 szt. (95,7%). Oceniane stada zwierząt futerkowych roślinożernych rozmieszczone były na terenie całego kraju ale większa część - 4 664 szt. (56,5%) była oceniana w części południowo-wschodniej, południowej, centralnej i wschodniej Polski.

II. 1. WYNIKI OCENY FENOTYPU

Ocena fenotypu zwierząt futerkowych mięsożernych obejmuje ocenę organoleptyczną wyglądu ogólnego zwierzęcia, uwzględniającą budowę zwierzęcia i jego okrywą włosową, w celu ustalenia stopnia zgodności z wzorcem odmiany, wyrażonego literami i znakami: A, B+, B lub C. Wyniki uzyskane w 2019 r. przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Wyniki oceny fenotypu mięsożernych zwierząt futerkowych w 2019 r.

Gatunek, odmiana	Liczba zwierząt /szt./		Procent zwierząt					
	odsadzonych	ocenionych	ocenionych	zaliczonych do kategorii				przeznaczonych do hodowli
				A	B+	B	C	
Lisy pospolite ogółem	3 218	470	14,6	36,8	40,6	19,4	3,2	96,8
w tym:								
- lisy pospolite srebrzyste	2 726	395	14,5	42,8	42,3	11,6	3,3	96,7
- lisy pospolite pastelowe	240	36	15,0	2,8	36,1	58,3	2,8	97,2
- lisy pospolite białoszynne	252	39	15,5	7,7	28,2	61,5	2,6	97,4
Lisy polarne	4 290	2 104	49,0	54,2	39,7	5,2	0,9	99,1
Norki amerykańskie ogółem	73 371	26 647	36,3	25,3	20,3	19,2	35,2	64,8
w tym:								
- norki odmiany standard	4 759	611	12,8	51,6	34,5	9,0	4,9	95,1
- norki odmian barwnych ogółem:	68 612	26 036	37,9	24,7	20,0	19,4	35,9	64,1
w tym odmiany:								
- pastel	38 154	17 440	45,7	31,1	20,1	16,6	32,2	67,8
- biała Hedlunda	982	239	24,3	8,8	30,1	27,6	33,5	66,5
- palomino	5 323	1 051	19,7	2,2	18,9	28,3	50,6	49,4
- krzyżak	8 352	1 662	19,9	33,3	22,1	24,7	19,9	80,1
- szafir	2 712	210	7,7	50,5	31,9	11,9	5,7	94,3
- perła	12 454	5 348	42,9	5,7	17,7	24,8	51,8	48,2
- silverblue	635	86	13,5	1,2	55,8	32,5	10,5	89,5
Tchórze	202	20	9,9	30,0	55,0	15,0	0,0	100,0
Jenoty	112	17	15,2	17,7	52,9	23,5	5,9	94,1

Ocena fenotypu zwierząt futerkowych roślinożernych, w zależności od gatunku, obejmuje wielkość zwierzęcia, budowę, typ barwny, barwę, czystość barwy i jakość okrywy włosowej, typ rasowy, specyficzne cechy rasowe oraz pas brzuszny oceniane organoleptycznie w celu ustalenia stopnia zgodności z wzorcem danej odmiany lub rasy i odmiany, wyrażonego w punktach. Wyniki uzyskane w 2019 r. przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Wyniki oceny fenotypu roślinożernych zwierząt futerkowych w 2019 r.

Gatunek, odmiana	Poddano ocenie fenotypu /szt./	Procent zwierząt						
		z punktacją /pkt/						zdyskwalifikowane do celów hodowlanych
		20-19	18-17	16-15	≤14	0	X	
Nutrie ogółem	157	55,5	40,1	3,8	0,6	0,0		0,0
w tym:								
- nutrie standardowe	34	35,3	44,1	17,7	2,9	0,0		0,0
- nutrie grenlandzkie	44	72,7	27,3	0,0	0,0	0,0		0,0
- nutrie perłowe	7	0,0	100	0,0	0,0	0,0		0,0
- nutrie czarne dominujące	16	75,0	25,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- nutrie bursztynowozłociste	14	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- nutrie pastelowe	14	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- nutrie sobolowe	14	64,3	35,7	0,0	0,0	0,0		0,0
- nutrie białe niealbinotyczne	14	57,1	42,9	0,0	0,0	0,0		0,0
		30-29	28-27	26-25	≤ 24	0	X	
Szynszyle ogółem	4 409	0,7	13,6	33,7	51,3	0,7		0,7
w tym:								
- szynszyle standard i czarne aksamitne	4 126	0,6	12,8	32,9	53,0	0,7		0,7
- szynszyle beżowe	283	2,8	24,7	46,0	26,5	0,0		0,0
		100-96	95,5-94	93,5-92	91,5-89	≤ 88,5	0	
Króliki	1 622	23,9	63,9	10,6	0,6	0,1	0,9	0,9

II. 2. WYNIKI OCENY UŻYTKOWOŚCI ROZPŁODOWEJ

Wyniki oceny użytkowości rozplodowej mięsożernych zwierząt futerkowych w stadach objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej w 2019 roku w porównaniu do roku 2018 zawarto w tabeli 5, wyniki oceny użytkowości rozplodowej roślinożernych zwierząt futerkowych - w tabeli 6.

Tabela 5. Wyniki oceny użytkowości rozplodowej zwierząt futerkowych mięsożernych w stadach objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej w latach 2018–2019.

Gatunek, odmiana. Rok	Liczba samic do krycia [%]	Procent samic						Średnia liczba młodych od 1 samicy		Procent odchowu młodych /odchowane do urodzonych/
		niepokrytych	jałowych	roniących	padłych	wykończonych	niszczących mioty	urodzonych*/	odchowanych*/	

Lisy pospolite ogółem

2018	100	4,5	6,7	0,8	0,5	87,5	4,1	4,0	3,4	85,2
2019	100	2,0	5,6	1,3	1,0	90,1	9,0	4,0	3,3	80,8

w tym:

lisy pospolite srebrzyste

2018	100	4,8	5,9	0,7	0,6	88,0	4,6	3,9	3,3	86,0
2019	100	2,3	4,9	1,3	1,0	90,5	8,2	3,9	3,3	83,5

lisy pospolite pastelowe

2018	100	4,1	12,2	1,3	0,0	82,4	8,1	5,1	4,6	90,5
2019	100	1,4	2,8	2,8	1,4	91,6	22,2	4,5	3,3	74,1

lisy pospolite białoszyjne

2018	100	1,9	11,5	1,0	0,0	85,6	5,8	4,9	3,7	74,2
2019	100	0,0	14,0	0,0	1,1	84,9	5,8	4,6	2,9	64,0

Lisy polarne

2018	100	4,5	6,0	1,2	0,0	88,3	2,2	4,5	4,1	92,8
2019	100	4,5	4,9	0,7	0,0	89,9	2,2	4,5	4,2	93,7

Jenoty

2018	100	0,0	8,5	2,1	2,1	87,3	4,3	5,5	4,2	75,8
2019	100	4,0	32,0	0,0	8,0	56,0	16,0	3,5	2,2	64,4

Tchórze

2018	100	29,0	27,5	0,0	1,5	42,0	2,9	3,2	2,2	69,1
2019	100	0,0	3,6	0,0	10,7	85,7	7,1	9,0	7,2	80,5

*/ średnie obliczone w stosunku do liczby samic do krycia

Tabela 5. cd.

Gatunek, odmiana. Rok	Liczba samic do krycia [%]	Procent samic						Średnia liczba młodych od 1 samicy		Procent odchowu młodych /odchowane do urodzonych/
		niepokrytych	jałowych	roniących	padłych	wykończonych	niszczących mioty	urodzonych*/	odchowanych*/	

Norki amerykańskie ogółem

2018	100	3,0	4,4	0,5	2,5	89,6	4,6	4,8	4,3	90,2
2019	100	3,6	4,2	0,3	2,2	89,7	6,9	4,5	4,1	90,3

w tym odmiany:

norki standard

2018	100	2,1	2,8	1,5	2,0	91,6	6,1	4,4	3,9	89,2
2019	100	8,2	0,2	1,6	2,0	88,0	16,4	4,5	3,6	80,6

norki pastel

2018	100	4,1	4,2	0,2	1,3	90,2	4,2	4,8	4,4	91,5
2019	100	3,5	3,0	0,1	1,1	92,3	5,6	4,6	4,1	90,2

norki krzyżak

2018	100	0,8	5,7	0,2	2,9	90,4	5,5	5,0	4,4	88,4
2019	100	1,8	7,1	0,6	2,5	88,0	5,4	4,6	4,1	89,2

norki biała Hedlunda

2018	100	0,0	3,8	0,0	1,5	94,7	4,5	3,6	2,8	76,6
2019	100	3,2	5,4	0,0	0,7	90,7	2,9	3,8	3,5	91,9

norki szafir

2018	100	1,0	6,9	4,0	20,5	67,6	5,1	2,8	2,6	93,2
2019	100	2,5	9,9	1,9	18,9	66,8	8,3	2,9	2,7	85,4

norki palomino

2018	100	0,0	2,2	0,0	1,0	96,8	3,4	5,9	5,1	87,5
2019	100	3,7	5,9	0,0	1,0	89,4	8,3	5,2	4,7	89,3

norki perła

2018	100	4,0	4,8	0,0	1,5	89,7	4,0	5,1	4,6	89,9
2019	100	3,3	4,4	0,0	0,8	91,5	7,2	4,4	4,2	95,3

norki silverblue

2018	100	0,0	6,7	0,7	1,3	91,3	20,0	4,8	4,0	82,9
2019	100	0,0	10,0	0,0	0,7	89,3	14,7	4,7	4,2	89,4

*/ średnie obliczone w stosunku do liczby samic do krycia

Tabela 6. Wyniki oceny użytkowości rozplodowej zwierząt futerkowych roślinożernych w stadach objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej w latach 2018–2019.

Gatunek, odmiana. Rok	Średnia liczba miotów uzyskana od 1 samicy w roku*/	Średnia liczba młodych uzyskana od 1 samicy w roku*/		Średnia liczba młodych uzyskana z 1 miotu w roku*/		Procent odchowu /odchowane do urodzonych/
		urodzonych	odchowanych	urodzonych	odchowanych	

Nutrie ogółem

2018	0,7	2,9	2,4	4,5	3,7	81,3
2019	0,7	3,3	2,4	4,7	3,5	74,4

w tym odmiany:

nutrie standardowe

2018	0,4	2,2	1,5	5,3	3,6	68,9
2019	0,5	2,6	1,8	5,4	3,8	70,6

nutrie czarne dominujące

2018	0,7	3,1	2,5	4,4	3,6	81,1
2019	0,9	4,0	2,5	4,6	2,8	61,7

nutrie bursztynowozłociste

2018	0,6	2,7	2,3	4,2	3,6	84,2
2019	0,8	2,8	2,3	3,6	3,0	83,3

nutrie grenlandzkie

2018	0,9	3,7	3,2	4,1	3,6	86,6
2019	0,8	3,5	2,5	4,3	3,1	71,6

nutrie perłowe

2018	1,0	3,8	3,6	3,8	3,6	94,7
2019	1,0	4,9	4,6	4,9	4,6	94,1

nutrie pastelowe

2018	0,8	3,9	3,1	4,8	3,8	79,1
2019	0,8	4,4	3,8	5,3	4,7	87,5

nutrie białe niealbinotyczne

2018	0,7	3,3	2,8	5,0	4,2	83,3
2019	0,4	1,8	1,2	4,5	3,0	66,7

nutrie sobolowe

2018	0,3	1,1	1,1	4,0	4,0	100,0
2019	0,8	3,3	2,3	4,3	3,0	69,2

Szynszyle ogółem

2018	1,5	3,3	2,9	2,1	1,9	89,7
2019	1,5	3,1	2,8	2,1	1,9	89,2

w tym odmiany:

szynszyle standard i czarne aksamitne

2018	1,5	3,3	2,9	2,1	1,9	89,7
2019	1,5	3,1	2,8	2,1	1,9	89,2

szynszyle beżowe

2018	1,4	3,0	2,7	2,1	1,9	89,6
2019	1,5	3,1	2,8	2,1	1,9	90,2

*/ średnie obliczone w stosunku do średniego stanu samic użytkowanych rozplodowo

Tabela 6. cd.

Gatunek, odmiana. Rok	Średnia liczba miotów uzyskana od 1 samicy w roku*/	Średnia liczba młodych uzyskana od 1 samicy w roku*/		Średnia liczba młodych uzyskana z 1 miotu w roku*/		Procent odchowu /odchowane do urodzonych/
		urodzonych	odchowanych	urodzonych	odchowanych	
Króliki ogółem						
2018	1,8	11,2	9,4	6,2	5,2	83,9
2019	1,8	11,2	9,4	6,2	5,2	84,5
w tym rasy:						
królik belgijski olbrzym biały						
2018	1,2	7,0	5,7	6,1	4,9	81,2
2019	1,0	6,1	4,9	6,0	4,8	80,4
królik belgijski olbrzym						
2018	1,3	8,2	6,3	6,1	4,7	77,3
2019	1,4	8,5	6,4	6,3	4,7	74,6
królik olbrzym srokacz						
2018	1,2	8,2	5,8	6,9	4,9	70,9
2019	1,5	10,2	7,3	7,0	5,0	71,6
królik francuski baran						
2018	1,1	6,1	5,1	5,7	4,7	83,4
2019	1,0	5,9	4,7	5,8	4,6	79,8
królik morawski olbrzym						
2018	1,2	8,7	6,8	7,3	5,7	78,2
2019	1,4	8,4	7,2	6,0	5,1	85,7
królik francuski srebrzysty						
2018	0,6	6,6	3,9	10,6	6,2	58,5
2019	1,0	6,1	5,6	6,1	5,6	91,8
królik wielki jasnosrebrzysty						
2018	1,3	8,7	7,3	6,6	5,6	84,4
2019	1,2	7,4	6,6	6,0	5,3	89,1
królik szynszyl wielki						
2018	1,0	5,8	5,5	5,8	5,5	95,7
2019	1,0	4,0	4,0	4,0	4,0	100,0
królik wiedeński niebieski						
2018	1,4	7,7	6,7	5,6	4,9	86,8
2019	1,2	6,5	5,4	5,6	4,7	83,1
królik wiedeński czarny						
2018	1,1	6,8	6,3	6,2	5,8	92,6
2019	1,4	9,7	8,4	7,0	6,0	86,4
królik wiedeński biały						
2018	1,0	5,4	4,1	5,4	4,1	76,7
2019	1,0	5,8	4,0	5,8	4,0	69,0
królik wiedeński szary						
2018	1,4	7,9	7,4	5,5	5,2	93,8
2019	1,3	7,2	6,4	5,4	4,8	89,2
królik nowozelandzki czerwony						
2018	1,3	7,2	6,1	5,5	4,6	83,9
2019	1,6	8,8	7,3	5,7	4,7	83,0

*/ średnie obliczone w stosunku do średniego stanu samic użytkowanych rozplodowo

Tabela 6. cd.

Gatunek, odmiana. Rok	Średnia liczba miotów uzyskana od 1 samicy w roku*/	Średnia liczba młodych uzyskana od 1 samicy w roku*/		Średnia liczba młodych uzyskana z 1 miotu w roku*/		Procent odchowu /odchowane do urodzonych/
		urodzonych	odchowanych	urodzonych	odchowanych	
królik nowozelandzki biały						
2018	1,6	7,8	6,8	4,7	4,1	87,3
2019	1,4	7,3	6,3	5,2	4,5	86,8
królik burgundzki						
2018	1,0	7,7	6,6	7,6	6,5	85,8
2019	0,9	6,2	5,4	6,7	5,9	87,3
królik kalifornijski						
2018	1,4	8,4	7,4	5,9	5,2	87,4
2019	1,5	8,2	7,1	5,4	4,7	87,5
królik popielniański biały						
2018	2,7	16,7	14,3	6,3	5,4	85,9
2019	2,6	16,4	14,2	6,3	5,5	86,3
królik termondzki biały						
2018	3,0	22,2	19,0	7,5	6,4	85,7
2019	3,2	22,2	20,0	7,0	6,3	90,0
królik castorex						
2018	1,0	6,0	4,3	6,0	4,3	72,2
2019	1,2	5,5	4,8	4,7	4,1	87,9
królik podpalany czarny						
2018	1,0	3,5	2,9	3,4	2,9	85,2
2019	1,1	4,4	4,1	4,1	3,9	93,1
królik hermelin						
2018	1,9	6,1	5,1	3,2	2,7	84,4
2019	2,2	7,3	5,4	3,4	2,5	73,6
królik hawana						
2018	1,0	5,3	4,0	5,3	4,0	75,0
2019	1,0	6,6	4,8	6,6	4,8	72,7
królik holenderski						
2018	1,4	6,6	5,2	4,7	3,7	78,8
2019	0,8	4,0	3,6	5,3	4,8	90,6
królik zajęczak						
2018	1,7	9,3	6,4	5,6	3,8	68,7
2019	0,8	7,6	5,4	10,2	7,2	70,5
królik rex biały czerwonoooki						
2018	1,0	5,0	0,5	5,0	0,5	10,0
2019	0,8	2,6	2,6	3,5	3,5	100,0
królik rex ryś						
2018	1,0	3,0	1,5	3,0	1,5	50,0
2019	0,4	2,1	2,1	5,7	5,7	100,0

*/ średnie obliczone w stosunku do średniego stanu samic użytkowanych rozplodowo

III. KSIĘGI HODOWLANE

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt prowadzi księgi hodowlane dla każdego z gatunków zwierząt futerkowych: lisów pospolitych, lisów polarnych, norek amerykańskich, tchórz, jenotów, nutrii, szynszyli i królików. W 2019 roku do ksiąg hodowlanych dla zwierząt futerkowych wpisano 9 stad – wszystkie do części wstępnej księgi, w tym: 8 stad królików i 1 stado szynszyli. Liczbę stad wpisanych do części wstępnej i głównej ksiąg dla zwierząt futerkowych oraz liczbę samic i samców w stadach wpisanych na dzień 31.12.2019 r. przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Liczba stad poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych wpisanych do ksiąg oraz liczba samic i samców w stadach wpisanych do ksiąg na dzień 31.12.2019 r.

Gatunek	Liczba stad wpisanych do części księgi		Liczba zwierząt w stadach wpisanych do części wstępnej		Liczba zwierząt w stadach wpisanych do części głównej	
	wstępna	główna	samce	samice	samce	samice
Lisy pospolite	1	9	22	72	172	918
Lisy polarne	-	3	-	-	200	1 010
Norki amerykańskie	7	19	919	4 342	3 293	13 634
Tchórze	-	1	-	-	9	28
Jenoty	-	1	-	-	13	50
Nutrie	4	10	14	50	43	157
Szynszyle	20	20	463	1 842	530	2 323
Króliki	63	66	173	714	248	1 065
Ogółem w kraju	95	129	1 591	7 020	4 508	19 185

IV. WYSTAWY I POKAZY

1. XXI KRAJOWY POKAZ SUROWYCH SKÓR ZWIERZĄT FUTERKOWYCH W BYDGOSZCZY

W dniu 02.02.2019 r. odbył się XXI Krajowy Pokaz Surowych Skór Futerkowych w Bydgoszczy, którego organizatorami byli Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, „Skinpox” Sp. z o.o. oraz Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Zaprezentowano łącznie 2 160 szt. skór. Liczbę skór zgłoszonych w danym gatunku i odmianie barwnej

(zgodnie z protokołem oceny), a także liczbę lotów oraz hodowców prezentujących skóry zawarto w zestawieniu:

Liczba skór zgłoszonych w danym gatunku i odmianie barwnej	Liczba lotów	Liczba hodowców zgłaszających skóry
200 szt. skór norek amerykańskich – Demi Wild – samce	40	21
190 szt. skór norek amerykańskich – Demi Wild – samice	38	21
85 szt. skór norek amerykańskich - cross black – samce	17	11
30 szt. skór norek amerykańskich - cross silverblue – samce	6	4
75 szt. skór norek amerykańskich - cross black - samice	15	6
50 szt. skór norek amerykańskich - cross silverblue – samice	10	8
80 szt. skór norek amerykańskich - cross palomino, perła – samce	16	8
70 szt. skór norek amerykańskich - cross palomino, perła – samice	14	8
160 szt. skór norek amerykańskich - silverblue (samce)	32	19
145 szt. skór norek amerykańskich - silverblue (samice)	29	20
110 szt. skór norek amerykańskich - białe (samce)	22	13
135 szt. skór norek amerykańskich - białe (samice)	27	16
150 szt. skór norek amerykańskich - perła (samce)	30	14
155 szt. skór norek amerykańskich - perła (samice)	31	19
155 szt. skór norek amerykańskich - palomino (samce)	31	14
135 szt. skór norek amerykańskich - palomino (samice)	27	13
5 szt. skór norek amerykańskich – szafir (samce)	1	1
5 szt. skór norek amerykańskich – szafir (samice)	1	1
55 szt. skór norek amerykańskich - mahogan (samce)	11	9
85 szt. skór norek amerykańskich – mahogan (samice)	17	10
20 szt. skór norek amerykańskich - topaz (samce)	4	4
10 szt. skór norek amerykańskich - topaz (samice)	2	2
10 szt. skór norek amerykańskich - topaz (samice)	2	2
15 szt. skór norek amerykańskich - czarne (samce)	3	3
30 szt. skór norek amerykańskich - czarne (samice)	6	5

2. WYSTAWY REGIONALNE I BRANŻOWE

W 2019 r. odbyło się kilkadziesiąt regionalnych i branżowych wystaw zwierząt futerkowych, podczas których w ocenie zwierząt uczestniczyli pracownicy Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół KCHZ:

- XVI Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Gołębi w Wieluniu.
- Regionalna Wystawa Gołębi, Drobiu Ozdobnego i Królików w Poznaniu.
- III Stargardzka Wystawa Gołębi i Drobego Inwentarza w Stargardzie.
- XI Ogólnopolska Wystawa Królików w Lublinie.
- XLII Seminarium i Wystawa Szynszyli w Myślenicach.
- Regionalna Wystawa Drobego Inwentarza w Minikowie.
- XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie.
- XII Kujawsko-Pomorskie Seminarium i Wystawa Szynszyli w Minikowie.
- XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Książu.
- XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale.
- Wystawa Królików podczas XXXII edycji Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2019 w Barzkowicach.
- VII Krajowa Wystawa Królików w Konstantynowie Łódzkim.
- Jesienna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu.
- Wystawa Drobego Inwentarza w Żninie.
- III Międzynarodowa Wystawa Królików w Bielsku Podlaskim.
- Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agropromocja 2019 w Nawojowej.
- Wystawa Drobego Inwentarza w Minikowie.
- XLIII Seminarium i Wystawa Szynszyli w Krakowie.
- III Ogólnopolska Wystawa Królików w Boguchwale.
- IX Mazowiecka Wystawa w Broniszach.
- Wystawa Królików w Lublinie.
- X Specjalistyczna Krajowa Wystawa Królików Rasowych i Drobego Inwentarza w Pniewach.
- VI Wystawa Gołębi Rasowych i Drobego Inwentarza w Unisławiu.
- XXXVII Wystawa w Lipnie.

[illegible]

[illegible]

[illegible]